



五種混合予防接種について

(D P T - I P V - H i b)

五種混合予防接種は、従来の四種混合（ジフテリア・百日せき・破傷風・不活化ポリオ）に「Hib」を加えた混合ワクチンを使用します。

「ジフテリア」は、高熱と犬の遠吠えのようなせきが特徴です。重症になると心筋障害や窒息を起こします。「百日せき」は、長く続くせきが特徴で、赤ちゃんがかかると肺炎や脳症などの重い合併症になることもあります。「破傷風」は、傷口から感染し、菌の出す毒素が筋肉の硬直や呼吸マヒを起こすため、命にかかわる病気です。「ポリオ」は、小児マヒとも呼ばれ、感染によって手足のマヒを起こすことがあります。

「Hib 感染症（インフルエンザ菌 b 型）」は中耳炎、副鼻腔炎、気管支炎の他、髄膜炎、敗血症、肺炎などの重篤な感染症を起こします。

●接種対象年齢、接種スケジュールについて

生後 2 か月以上 90 か月（7 歳 6 か月）未満

《スケジュール》

1 期初回はそれぞれ 20 日以上あけて 3 回 【標準的な（おすすめの）接種間隔】 20 日～56 日

1 期追加は初回終了後 6 か月以上あけて 1 回

【標準的な（おすすめの）接種間隔】 初回終了後 6 か月以上 18 か月未満 （計 4 回）

●次の人は、予防接種を受けることができません。

- (1) 明らかに発熱（通常 37.5 度以上）をしている人
- (2) 重篤な急性疾患にかかっていることが明らかな人
- (3) 当該疾病に係る予防接種の成分によってアナフィラキシーを起こしたことがある人
- (4) その他、医師が不適当な状態と判断した人

◎予防接種による健康被害救済制度

この予防接種による万が一の健康被害発生時には、予防接種法による給付を受けることができます。

異なるワクチンの接種間隔について

「異なる種類の注射生ワクチン（BCG・MR・水痘など）どうしの接種間隔は 27 日以上の間隔をあけること」以外の制限はございません。

ただし、同一の種類のワクチンの接種間隔（例：ロタウイルスワクチンの 1 回目と 2 回目は 27 日以上あける）については規定がございますので、ご注意ください。

生後2カ月からの接種スケジュールについて（例）

	ロタウイルス	肺炎球菌	B型肝炎	五種混合	B C G	MR	水痘
接種回数	2または3回	4回	3回	4回	1回	2回	2回
2カ月	①	①	①	①			
3カ月	②	②	②	②			
4カ月	(③)	③		③			
5カ月					↑		
6カ月					①		
7カ月			③		↓		
8カ月							
...							
11カ月							
12カ月		↑				①	↑
13カ月		④					①
14カ月		↓					↓
15カ月							
16カ月				↑			
17カ月				④			
...				↓			②
22カ月							
備考	ワクチンの種類によって接種回数が異なる	開始する年齢によって接種回数が異なる	定期接種は、1歳誕生日の前日まで		定期接種は、1歳誕生日の前日まで	2回目(2期)は、年長児のとき	2回目は、1回目接種後3か月以上あける

この予防接種は防衛省からの交付金を使って実施しています。

2026.6 ver