

# 麻疹・風疹PCR検査検体提出方法について

## 1. 検体採取の際の留意事項

### 【咽頭ぬぐい液】

咽頭等をぬぐった滅菌綿棒\*1を、空の(培地が入っていない)滅菌スピッツまたはウイルス検査用(ウイルス培地入り)のスピッツ\*2に入れ、柄の部分を折り、スピッツの蓋をしっかりと閉めてください。

\*1綿棒は、ウイルス用合成樹脂素材のものを使用してください。

\*2細菌検査用(細菌用培地入り)のスピッツは使用しないでください。

### 【血液】

抗凝固剤入り採血管(EDTA 又はクエン酸入り採血管※)に全血、5ml程度(小児の場合には2ml以上)の採血を行ってください。

※ヘパリン入り採血管や血清分離剤入りの採血管は使用しないでください。

### 【尿】

医療機関で所有している尿専用スピッツ(滅菌空容器)に10ml程度採取を行い、しっかり蓋を閉めてください。

## 2. 検体の保存法

- ・回収に伺うまで、3検体(咽頭ぬぐい液、血液、尿)は4℃で冷蔵保存してください。
- ・検体を採取したら、横須賀市保健所にご連絡をお願いします。

## 3. その他

3検体の確保が難しい場合は、横須賀市保健所にご相談ください。

横須賀市保健所 保健予防課

TEL:046-822-4317 FAX:046-822-4874