

大気環境の状況について

横須賀市では、大気汚染防止法第 20 条及び第 22 条第 1 項に基づき、二酸化窒素等に係る大気汚染の常時監視を、一般環境大気測定局（以下、「一般局」）4 局（追浜行政センター、久里浜行政センター、西行政センター及び池上コミュニティセンター）及び自動車排出ガス測定局（以下、「自排局」）1 局（小川町交差点）で行った。

また、有害大気汚染物質モニタリング調査を横須賀市役所及び追浜行政センターで実施した。

1 大気汚染物質の常時監視測定結果

二酸化窒素

単位：ppm

測定局名	測定地点の属性	日平均値の 98% 値	環境基準	環境基準の達成状況	年平均值	概況
追浜行政センター	一般環境	0.026	0.06	達成	0.010	一般局及び自排局の年平均值は、近年、横ばいで推移している。
久里浜行政センター	一般環境	0.027		達成	0.009	
西行政センター	一般環境	0.023		達成	0.008	
池上コミュニティセンター	一般環境	0.024		達成	0.009	
小川町交差点	自動車排出ガス	0.031		達成	0.012	

注）二酸化窒素の環境基準の達成状況は日平均値の 98% 値で評価する。

浮遊粒子状物質

単位：mg/m³

測定局名	測定地点の属性	日平均値の 2 % 除外値	環境基準	環境基準の達成状況	年平均值	概況
追浜行政センター	一般環境	0.041	0.10	達成	0.016	一般局及び自排局の年平均值は、近年、横ばいで推移している。
久里浜行政センター	一般環境	0.037		達成	0.014	
西行政センター	一般環境	0.035		達成	0.014	
池上コミュニティセンター	一般環境	0.032		達成	0.013	
小川町交差点	自動車排出ガス	0.037		達成	0.016	

注）浮遊粒子状物質の環境基準の達成状況は日平均値の 2 % 除外値で評価する。

微小粒子状物質

単位：μg/m³

測定局名	測定地点の属性	日平均値 の 98%値	年平均値	環境基準		環境基準の 達成状況		概況
				短期	長期	短期	長期	
追浜行政センター	一般環境	21.4	8.9	35	15	達成	達成	一般局及び自排局の年平均値は近年、横ばいで推移している。
久里浜行政センター	一般環境	20.0	8.7			達成	達成	
西行政センター	一般環境	22.0	8.8			達成	達成	
池上コミュニティセンター	一般環境	19.9	7.6			達成	達成	
小川町交差点	自動車排出ガス	20.5	8.7			達成	達成	

注）微小粒子状物質の環境基準の達成状況は日平均値の98%値（短期的評価）及び年平均値（長期的評価）で評価する。

光化学オキシダント

単位：ppm

測定局名	測定地点の属性	1時間 値の 最高値	環境基準	環境基準の 達成状況	年平均値	概況
追浜行政センター	一般環境	0.126	0.06	非達成	0.033	一般局の年平均値は近年、横ばいで推移している。
久里浜行政センター	一般環境	0.120		非達成	0.032	
西行政センター	一般環境	0.101		非達成	0.035	
池上コミュニティセンター	一般環境	0.104		非達成	0.031	

注）光化学オキシダントの環境基準の達成状況は昼間（5時～20時）の1時間値の評価による。

二酸化硫黄

単位：ppm

測定局名	測定地点の属性	日平均 値の 2% 除外値	環境基準	環境基準の 達成状況	年平均値	概況
追浜行政センター	一般環境	0.009	0.04	達成	0.002	一般局の年平均値は近年、横ばいで推移している。
久里浜行政センター	一般環境	0.002		達成	0.001	
池上コミュニティセンター	一般環境	0.002		達成	0.001	

注）二酸化硫黄の環境基準の達成状況は日平均値の2%除外値で評価する。

一酸化炭素

単位：ppm

測定局名	測定地点の属性	日平均 値の 2 % 除外値	環 境 基 準	環 境 基 準 の 達 成 状 況	年平均値	概 況
小川町交差点	自動車排出ガス	0.5	10	達成	0.2	自排局の年平均値は近年、横ばいで推移している。

注) 一酸化炭素の環境基準の達成状況は日平均値の2 %除外値で評価する。

2 有害大気汚染物質モニタリング調査結果

環境基準が設定されているベンゼン、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ジクロロメタンの4物質については、測定を行った2地点すべてで環境基準を達成した。

また、指針値が設定されているアクリロニトリル、アセトアルデヒド、塩化ビニルモノマー、塩化メチル、クロロホルム、1,2-ジクロロエタン、水銀及びその化合物、ニッケル化合物、ヒ素及びその化合物、1,3-ブタジエン、マンガン及びその化合物の11物質についても、測定を行った2地点すべてで指針値を満足した。

なお、基準が定められていない上記以外の7物質についても、環境省及び自治体が実施した令和6年度有害大気汚染物質モニタリング調査結果による全国平均値とほぼ同レベルであった。

有害大気汚染物質モニタリング調査結果

測定点：横須賀市役所

単位：μg/m³

測定項目	測定地点属性	令和7年度 年平均値	環境基準値	環境基準 の 達成状況	令和6年度 属性別 全国平均値
ベンゼン	一般環境	0.61	3	達成	0.59
トリクロロエチレン	一般環境	0.27	130	達成	0.25
テトラクロロエチレン	一般環境	0.064	200	達成	0.065
ジクロロメタン	一般環境	1.2	150	達成	1.2

注) 平均値を算出する際、検出下限値未満の測定値は検出下限値の1/2として算出した。

測定点：追浜行政センター

単位：μg/m³

測定項目	測定地点属性	令和7年度 年平均値	環境基準値	環境基準 の 達成状況	令和6年度 属性別 全国平均値
ベンゼン	固定発生源周辺	0.55	3	達成	0.91
トリクロロエチレン	一般環境	0.28	130	達成	0.25
テトラクロロエチレン	一般環境	0.060	200	達成	0.065
ジクロロメタン	固定発生源周辺	1.3	150	達成	1.9

— 今後の取組み —

- 工場等の固定発生源に対しては、大気汚染防止法や神奈川県生活環境の保全等に関する条例に基づき規制基準の遵守等について指導を行い、一層の徹底を図る。
- 自動車等の移動発生源に対しては、自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法や神奈川県生活環境の保全等に関する条例に基づき施策を着実に推進する。
- 今後も環境モニタリング調査を継続して実施し、市民等への情報提供を行う。


大気環境の状況について（資料編）

I 大気汚染物質の常時監視測定結果

1. 測定局別測定項目

横須賀市では、大気汚染の状況を監視するため、一般環境大気測定局（以下「一般局」という。）4局及び自動車排出ガス測定局（以下「自排局」という。）1局において、次の項目について測定を実施した。

測定局（所在地）		二酸化窒素	浮遊粒子状物質	微小粒子状物質	光化学オキシダント	二酸化硫黄	一酸化炭素
一般環境	追浜行政センター （夏島町9）	○	○	○	○	○	
	久里浜行政センター （久里浜6-14-2）	○	○	○	○	○	
	西行政センター （長坂1-2-2）	○	○	○	○		
	池上コミュニティセンター （池上4-6-1）	○	○	○	○	○	
自動車排出ガス	小川町交差点 （小川町3）	○	○	○			○



2. 環境基準及びその評価方法

(1) 環境基準

項目	環境基準
二酸化窒素 (NO_2)	1 時間値の 1 日平均値が 0.04ppm から 0.06ppm までのゾーン内又はそれ以下であること。
浮遊粒子状物質 (SPM)	1 時間値の 1 日平均値が $0.10\text{mg}/\text{m}^3$ 以下であり、かつ、1 時間値が $0.20\text{mg}/\text{m}^3$ 以下であること。
微小粒子状物質 ($\text{PM}_{2.5}$)	1 年平均値 $15\mu\text{g}/\text{m}^3$ 以下であり、かつ、1 日平均値が $35\mu\text{g}/\text{m}^3$ 以下であること。
光化学オキシダント (O_x)	1 時間値が 0.06ppm 以下であること。
二酸化硫黄 (SO_2)	1 時間値の 1 日平均値が 0.04ppm 以下であり、かつ、1 時間値が 0.1ppm 以下であること。
一酸化炭素 (CO)	1 時間値の 1 日平均値が 10ppm 以下であり、かつ、1 時間値の 8 時間平均値が 20ppm 以下であること。 (8 時間平均値とは、0 時から 8 時、8 時から 16 時、16 時から 24 時までの各時間帯の平均値をいう。)

(2) 評価方法

○ 二酸化窒素 (NO_2)

年間の 1 日平均値のうち、低い方から 98% に相当するもの (年間 98% 値) を環境基準と比較して評価する。

○ 浮遊粒子状物質 (SPM)、二酸化硫黄 (SO_2)、及び一酸化炭素 (CO)

年間の 1 日平均値のうち、高い方から 2% の範囲にあるものを除外 (365 日分の測定値がある場合は、7 日分の測定値を除外) した後の最高値 (2% 除外値) を環境基準と比較して評価する。ただし、上記の評価方法にかかわらず、環境基準を超える日が 2 日以上連続した場合は、非達成と評価する。

○ 微小粒子状物質 ($\text{PM}_{2.5}$)

長期基準及び短期基準の両方を満足した場合に、環境基準を達成したと判断する。

長期基準：測定結果の 1 年平均値を長期基準 (1 年平均値) と比較する。

短期基準：測定結果の 1 日平均値のうち年間 98 パーセンタイル値を代表値として、短期基準 (1 日平均値) と比較する。

○ 光化学オキシダント (O_x)

昼間の 1 時間値の年間最高値を環境基準と比較して評価する。

(昼間とは、5 時から 20 時までの時間帯をいう。)

3. 一般環境大気測定結果

追浜行政センターは昭和 46 年から、久里浜行政センターは昭和 48 年から、西行政センターは昭和 49 年から、池上コミュニティセンターは令和 3 年から測定を開始した。

二酸化窒素

環境基準の達成状況

二酸化窒素については、測定を行った 4 局すべてで環境基準を達成した。


なお、平成 14 年以降、測定を行った一般局すべてで環境基準を達成している。

単位：ppm

測定局名	有効測定日数	測定時間	年平均値	日平均値が 0.06ppm を超えた日数	日平均値が 0.04ppm 以上 0.06ppm 以下の日数	1 時間の値の最高値	日平均値の年間 98 % 値	98 % 値評価による日平均値が 0.06ppm を超えた日数	環境基準の達成状況
									長期的評価
追浜行政センター	363	8580	0.010	0	0	0.069	0.026	0	○
久里浜行政センター	364	8568	0.009	0	1	0.061	0.027	0	○
西行政センター	359	8539	0.008	0	0	0.054	0.023	0	○
池上コミュニティセンター	362	8589	0.009	0	0	0.059	0.024	0	○

一般局年平均値の推移

一般局年平均値（一般局での年平均値の平均）は近年、横ばいで推移している。



浮遊粒子状物質

環境基準の達成状況

浮遊粒子状物質（大気中に浮遊する粒子状物質のうち、粒径が $10\mu\text{m}$ （ μm ：1,000 分の 1mm）以下の粒子の総称）については、測定を行った 4 局すべてで環境基準を達成した。


なお、平成 15 年以降、測定を行った一般局すべてで環境基準を達成している。

単位： mg/m^3

測定局名	有効測定日数	測定時間	年平均値	1 時間値が $0.2\text{mg}/\text{m}^3$ を超えた時間数	日平均値が $0.1\text{mg}/\text{m}^3$ を超えた日数	1 時間値の最高値	日平均値の最高値	日平均値の 2% 除外値	日平均値が $0.1\text{mg}/\text{m}^3$ を超えた日が 2 日以上連続した日数	環境基準の長期的評価による日平均値が $0.1\text{mg}/\text{m}^3$ を超えた日数	環境基準の達成状況 長期的評価
追浜行政センター	363	8692	0.016	0	0	0.119	0.086	0.041	無	0	○
久里浜行政センター	363	8694	0.014	0	0	0.145	0.078	0.037	無	0	○
西行政センター	363	8696	0.014	0	0	0.173	0.066	0.035	無	0	○
池上コミュニティセンター	363	8696	0.013	0	0	0.095	0.066	0.032	無	0	○

一般局年平均値の推移

一般局年平均値（一般局での年平均値の平均）は近年、横ばいで推移している。



微小粒子状物質

環境基準の達成状況

微小粒子状物質（大気中に浮遊する粒子状物質のうち、粒径が $2.5\mu\text{m}$ （ μm ：1,000分の1mm）以下の粒子の総称）については、測定を行った4局すべてで長期基準（1年平均値 $15\mu\text{g}/\text{m}^3$ 以下）及び短期基準（1日平均値 $35\mu\text{g}/\text{m}^3$ 以下）ともに達成した。

なお、高濃度予報（注意喚起）は、発令されなかった。

<高濃度予報の発令基準>

（朝方の予報）午前5時から午前7時における各1時間値の平均値の中央値が $85\mu\text{g}/\text{m}^3$ を超過したとき


（日中の予報）午前5時から正午における各1時間値の平均値の中で $80\mu\text{g}/\text{m}^3$ を超過したとき

単位： $\mu\text{g}/\text{m}^3$

測 定 局 名	有 効 測 定 日 数	測 定 時 間	年 平 均 値	日 平 均 値 の 最 高 値	日 平 均 値 が $35\mu\text{g}/\text{m}^3$ を越えた日 数とその割合		1 時 間 値 の 最 高 値	日 平 均 値 の 98%値	98%値 評 価 に よ る 日 平 均 値 が $35\mu\text{g}/\text{m}^3$ を越えた 日 数	環 境 基 準 の 達 成 状 況	
					(日)	(%)				短 期 的 評 価	長 期 的 評 価
追浜行政センター	357	8563	8.9	43.3	2	0.6	53	21.4	0	○	○
久里浜行政センター	357	8559	8.7	43.8	2	0.6	53	20.0	0	○	○
西行政センター	357	8560	8.8	44.0	2	0.6	54	22.0	0	○	○
池上コミュニティセンター	328	7884	7.6	41.3	2	0.6	48	19.9	0	○	○

一般局年平均値の推移

一般局年平均値（一般局での年平均値の平均）は近年、横ばいで推移している。



光化学オキシダント

環境基準の達成状況

光化学オキシダントについては、測定を行った4局すべてで環境基準を達成しなかった。

また、光化学スモッグ注意報の発令日数は、全市域において1日であった。

なお、測定開始の昭和46年以降、測定を行った一般局すべてで環境基準を達成していない。全国の環境基準の達成状況も極めて低い水準となっている。

<注意報の発令基準>

光化学オキシダント濃度の1時間値が0.12ppm以上となり、その状態が継続すると認められるとき


単位：ppm

測定局名	昼間測定日数	昼間測定時間	昼間の1時間値の年平均値	昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数及び時間数		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数及び時間数		昼間の1時間値の最高値	昼間の1時間値の平均値	環境基準の達成状況 短期的評価
				日数	時間	日数	時間			
追浜行政センター	365	5401	0.033	67	302	2	2	0.126	0.046	×
久里浜行政センター	365	5398	0.032	51	219	1	1	0.120	0.045	×
西行政センター	365	5400	0.035	71	335	0	0	0.101	0.047	×
池上コミュニティセンター	365	5405	0.031	51	220	0	0	0.104	0.044	×

(注) 昼間とは、5時から20時までの時間帯をいう。

一般局年平均値の推移

一般局年平均値（一般局での年平均値の平均）は近年、横ばいで推移している。



二酸化硫黄

環境基準の達成状況

二酸化硫黄については、測定を行った3局すべてで環境基準を達成した。


なお、昭和56年以降、測定を行った一般局すべてで環境基準を達成している。

単位：ppm

測定局名	有効測定日数	測定時間	年平均値	1時間値が0.1ppmを超えた時間	日平均値が0.04ppmを超えた日数	1時間値の最高値	日平均値の最高値	日平均値の2%除外値	日平均値が0.04ppmを超えた日が2日以上連続した日	環境基準の長期的評価による日平均値が0.04ppmを超えた日数	環境基準の達成状況 長期的評価
追浜行政センター	365	8619	0.002	0	0	0.067	0.017	0.009	無	0	○
久里浜行政センター	363	8557	0.001	0	0	0.015	0.004	0.002	無	0	○
池上コミュニティセンター	365	8576	0.001	0	0	0.011	0.002	0.002	無	0	○

一般局年平均値の推移

一般局年平均値（一般局での年平均値の平均）は近年、横ばいで推移している。



4. 自動車排出ガス測定局測定結果

平成6年度から小川町（三笠駐車場）にて測定を開始し、平成26年度から小川町交差点（消防第1分団詰所）へ移設した。

二酸化窒素

環境基準の達成状況

二酸化窒素については、環境基準を達成した。


なお、平成16年以降、環境基準を達成している。

単位：ppm

測定局名	有効測定日数	測定時間	年平均値	日平均値が0.06ppmを超えた日数	日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	1時間値の最高値	日平均値の年間98%値	98%値評価による日平均値が0.06ppmを超えた日数	環境基準の達成状況 長期的評価
小川町交差点	364	8566	0.012	0	3	0.074	0.031	0	○

年平均値の推移

年平均値は近年、横ばいで推移している。



浮遊粒子状物質

環境基準の達成状況

浮遊粒子状物質（大気中に浮遊する粒子状物質のうち、粒径が $10\mu\text{m}$ （ μm ：1,000分の1mm）以下の粒子の総称）については、環境基準を達成した。


なお、平成15年以降、環境基準を達成している。

単位： mg/m^3

測定局名	有効測定日数	測定時間	年平均値	1時間値が $0.2\text{ mg}/\text{m}^3$ を超えた時間数	日平均値が $0.1\text{ mg}/\text{m}^3$ を超えた日数	1時間値の最高値	日平均値の最高値	日平均値の2%除外値	日平均値が $0.1\text{ mg}/\text{m}^3$ を超えた日が2日以上連続した日	環境基準の長期的評価による日平均値が $0.1\text{ mg}/\text{m}^3$ を超えた日数	環境基準の達成状況 長期的評価
小川町交差点	363	8697	0.016	0	0	0.11	0.070	0.037	無	0	○

年平均値の推移

年平均値は近年、横ばいで推移している。



微小粒子状物質

環境基準の達成状況


微小粒子状物質（大気中に浮遊する粒子状物質のうち、粒径が $2.5\mu\text{m}$ （ μm ：1,000分の1mm）以下の粒子の総称）については、長期基準（1年平均値 $15\mu\text{g}/\text{m}^3$ 以下）及び短期基準（1日平均値 $35\mu\text{g}/\text{m}^3$ 以下）ともに達成した。

単位： $\mu\text{g}/\text{m}^3$

測定局名	有効測定日数	測定時間	年平均値	日平均値の最高値	日平均値が $35\mu\text{g}/\text{m}^3$ を超えた日数とその割合		1時間値の最高値	日平均値の98%値	98%値評価による日平均値が $35\mu\text{g}/\text{m}^3$ を超えた日数	環境基準の達成状況	
					(日)	(%)				短期的評価	長期的評価
小川町交差点	357	8562	8.7	42.7	2	0.6	51	20.5	0	○	○

年平均値の推移

年平均値は近年、横ばいで推移している。



一酸化炭素

環境基準の達成状況


一酸化炭素については、環境基準を達成した。
 なお、平成6年以降、環境基準を達成している。

単位：ppm

測 定 局 名	有 効 測 日 定 数	測 定 時 間	年 平 均 値	8 時 間 平 均 値 が 20ppm を 超 えた 回 数	日 平 均 値 が 10ppm を 超 えた 日 数	1 時 間 値 の 最 高 値	日 平 均 値 の 最 高 値	日 平 均 値 の 2% 除 外 値	日 平 均 値 が 10ppm を 超 えた 日 が 2 日 以 上 連 続 した 日	環 境 基 準 の 長 期 的 評 価 に よ る 日 平 均 値 が 10ppm を 超 えた 日 数	環 境 基 準 の 達 成 状 況
										長 期 的 評 価	
小 川 町 交 差 点	364	8681	0.2	0	0	1.4	0.6	0.5	無	0	○

年平均値の推移

年平均値は近年、横ばいで推移している。



Ⅱ 有害大気汚染物質モニタリング調査結果

横須賀市では、神奈川県及び県内大気汚染防止法の政令市と連携して、有害大気汚染物質モニタリング調査を実施した。

1. 調査期間

令和7年4月から令和8年3月（毎月1回測定）

2. 調査対象物質

大気汚染による人への健康リスクがある程度高く、データの知見が比較的多く集まっている「優先取組物質」23 物質の中でダイオキシン類を除く 22 物質を調査対象物質とした。

	調 査 対 象 物 質
環境基準設定物質 (4 物質)	ベンゼン、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ジクロロメタン
指針値設定物質 (11 物質)	アクリロニトリル、アセトアルデヒド、塩化ビニルモノマー、塩化メチル、クロロホルム、1,2-ジクロロエタン、水銀及びその化合物、ニッケル化合物、ヒ素及びその化合物、1,3-ブタジエン、マンガン及びその化合物
上記以外の物質 (7 物質)	クロム及び三価クロム化合物、六価クロム化合物、酸化エチレン、トルエン、ベリリウム及びその化合物、ベンゾ[a]ピレン、ホルムアルデヒド

3. 調査地点

横須賀市役所（小川町 11 番地）、追浜行政センター（夏島町 9）の 2 地点で調査を実施している。



(参考)

環境省環境管理局長通知(平成 13 年 5 月 21 日環管大第 177 号、環管自第 75 号)抜粋

一般環境：固定発生源又は移動発生源からの有害大気汚染物質の排出の直接の影響を受けにくいと考えられる地点について、地域における有害大気汚染物質による大気汚染の状況の継続的把握が効果的になされる地点

固定発生源周辺：固定発生源における有害大気汚染物質の製造・使用状況、気象条件及び地理的条件を勘案して、排出が予想される物質の濃度が、固定発生源における他の地点と比較して相対的に高くなると考えられる地点

※ 測定地点の属性（一般環境、固定発生源周辺）は、物質ごとに発生源からの排出の状況等を考慮して決定している。

4. 測定方法

「有害大気汚染物質等測定方法マニュアル」（平成 31 年 3 月（令和 6 年 3 月改訂）環境省 水・大気環境局 環境管理課 環境汚染対策室）による。

5. 調査結果

(1) ベンゼン等環境基準設定物質

今回調査を行った 22 物質のうち、大気汚染に係る環境基準が設定されているものは、以下の 4 物質であり、その基準値は次のとおりである。

物 質	環 境 基 準 値
ベンゼン	年平均値が $0.003\text{mg}/\text{m}^3$ ($3\mu\text{g}/\text{m}^3$) 以下であること。
トリクロロエチレン	年平均値が $0.13\text{mg}/\text{m}^3$ ($130\mu\text{g}/\text{m}^3$) 以下であること。
テトラクロロエチレン	年平均値が $0.2\text{mg}/\text{m}^3$ ($200\mu\text{g}/\text{m}^3$) 以下であること。
ジクロロメタン	年平均値が $0.15\text{mg}/\text{m}^3$ ($150\mu\text{g}/\text{m}^3$) 以下であること。

調査結果の概要は次のとおりである。

① ベンゼン

横須賀市役所（一般環境）及び追浜行政センター（固定発生源周辺）の年平均値は、それぞれ $0.61\mu\text{g}/\text{m}^3$ 、 $0.55\mu\text{g}/\text{m}^3$ で、測定を行った 2 地点すべてで環境基準を達成した。

年平均値は、平成 13 年以降環境基準を達成し、近年は横ばい傾向である。

② トリクロロエチレン

横須賀市役所（一般環境）及び追浜行政センター（一般環境）の年平均値は、それぞれ $0.27\mu\text{g}/\text{m}^3$ 、 $0.28\mu\text{g}/\text{m}^3$ で、測定を行った 2 地点すべてで環境基準を達成した。

年平均値は、測定開始以降環境基準を達成し、近年は横ばい傾向である。

③ テトラクロロエチレン




横須賀市役所（一般環境）及び追浜行政センター（一般環境）の年平均値は、それぞれ $0.064 \mu\text{g}/\text{m}^3$ 、 $0.060 \mu\text{g}/\text{m}^3$ で、測定を行った2地点すべてで環境基準を達成した。


年平均値は、測定開始以降環境基準を達成し、近年は横ばい傾向である。

④ ジクロロメタン

横須賀市役所（一般環境）及び追浜行政センター（固定発生源周辺）の年平均値は、それぞれ $1.2 \mu\text{g}/\text{m}^3$ 、 $1.3 \mu\text{g}/\text{m}^3$ で、測定を行った2地点すべてで環境基準を達成した。

年平均値は、測定開始以降環境基準を達成し、近年は横ばい傾向である。





※ ジクロロメタンの平成 18 年度はコンタミネーションにより欠測とした。

※ 衣笠行政センターは平成 19 年度まで測定し、平成 20 年度からは横須賀市役所で測定している。

(2) アクリロニトリル等指針値設定物質

以下の 11 物質については、健康リスクの低減を図るための指針となる数値(指針値)が設定されている。

物 質	指 針 値
アクリロニトリル	年平均値が $2 \mu\text{g}/\text{m}^3$ 以下であること。
アセトアルデヒド	年平均値が $120 \mu\text{g}/\text{m}^3$ 以下であること。
塩化ビニルモノマー	年平均値が $10 \mu\text{g}/\text{m}^3$ 以下であること。
塩化メチル	年平均値が $94 \mu\text{g}/\text{m}^3$ 以下であること。
クロロホルム	年平均値が $18 \mu\text{g}/\text{m}^3$ 以下であること。
1,2-ジクロロエタン	年平均値が $1.6 \mu\text{g}/\text{m}^3$ 以下であること。
水銀及びその化合物	年平均値が $0.04 \mu\text{gHg}/\text{m}^3$ 以下であること。
ニッケル化合物	年平均値が $0.025 \mu\text{gNi}/\text{m}^3$ 以下であること。
ヒ素及びその化合物	年平均値が $0.006 \mu\text{gAs}/\text{m}^3$ 以下であること。
1,3-ブタジエン	年平均値が $2.5 \mu\text{g}/\text{m}^3$ 以下であること。
マンガン及びその化合物	年平均値が $0.14 \mu\text{gMn}/\text{m}^3$ 以下であること。

調査結果の概要は次のとおりである。

① アクリロニトリル

横須賀市役所 (一般環境) 及び追浜行政センター (一般環境) の年平均値は、それぞれ $0.018 \mu\text{g}/\text{m}^3$ 、 $0.016 \mu\text{g}/\text{m}^3$ で、測定を行った 2 地点すべてで指針値を満足した。

② アセトアルデヒド

横須賀市役所 (一般環境) 及び追浜行政センター (一般環境) の年平均値は、それぞれ $2.4 \mu\text{g}/\text{m}^3$ 、 $2.6 \mu\text{g}/\text{m}^3$ で、測定を行った 2 地点すべてで指針値を満足した。

③ 塩化ビニルモノマー

横須賀市役所 (一般環境) 及び追浜行政センター (一般環境) の年平均値は、それぞれ $0.053 \mu\text{g}/\text{m}^3$ 、 $0.026 \mu\text{g}/\text{m}^3$ で、測定を行った 2 地点すべてで指針値を満足した。

④ 塩化メチル

横須賀市役所（一般環境）及び追浜行政センター（固定発生源周辺）の年平均値は、それぞれ $1.8 \mu\text{g}/\text{m}^3$ 、 $1.3 \mu\text{g}/\text{m}^3$ で、測定を行った 2 地点すべてで指針値を満足した。

⑤ クロロホルム

横須賀市役所（一般環境）及び追浜行政センター（一般環境）の年平均値は、それぞれ $0.20 \mu\text{g}/\text{m}^3$ 、 $0.21 \mu\text{g}/\text{m}^3$ で、測定を行った 2 地点すべてで指針値を満足した。

⑥ 1,2-ジクロロエタン

横須賀市役所（一般環境）及び追浜行政センター（一般環境）の年平均値は、それぞれ $0.14 \mu\text{g}/\text{m}^3$ 、 $0.14 \mu\text{g}/\text{m}^3$ で、測定を行った 2 地点すべてで指針値を満足した。

⑦ 水銀及びその化合物

横須賀市役所（一般環境）及び追浜行政センター（一般環境）の年平均値は、それぞれ $0.0018 \mu\text{gHg}/\text{m}^3$ 、 $0.0020 \mu\text{gHg}/\text{m}^3$ で、測定を行った 2 地点すべてで指針値を満足した。

⑧ ニッケル化合物

横須賀市役所（一般環境）及び追浜行政センター（固定発生源周辺）の年平均値は、それぞれ $0.0025 \mu\text{gNi}/\text{m}^3$ 、 $0.0018 \mu\text{gNi}/\text{m}^3$ で、測定を行った 2 地点すべてで指針値を満足した。

⑨ ヒ素及びその化合物

横須賀市役所（一般環境）及び追浜行政センター（一般環境）の年平均値は、それぞれ $0.00076 \mu\text{gAs}/\text{m}^3$ 、 $0.00072 \mu\text{gAs}/\text{m}^3$ で、測定を行った 2 地点すべてで指針値を満足した。

⑩ 1,3-ブタジエン

横須賀市役所（一般環境）及び追浜行政センター（一般環境）の年平均値は、それぞれ $0.11 \mu\text{g}/\text{m}^3$ 、 $0.050 \mu\text{g}/\text{m}^3$ で、測定を行った 2 地点すべてで指針値を満足した。

⑪ マンガン及びその化合物

横須賀市役所（一般環境）及び追浜行政センター（固定発生源周辺）の年平均値は、それぞれ $0.020 \mu\text{gMn}/\text{m}^3$ 、 $0.015 \mu\text{gMn}/\text{m}^3$ で、測定を行った 2 地点すべてで指針値を満足した。

(3) その他の物質

その他の 7 物質の年平均値は、環境省及び各自治体を実施した令和 6 年度有害大気汚染物質モニタリング調査による全国平均値とほぼ同じレベルとなっている。

(4) 調査結果一覧表

横須賀市役所

単位：μg/m³

測定項目	測定地点 属性	令和7年度 年平均値	令和6年度 年平均値	令和6年度 属性別全国平均値	環境基準値 又は指針値
ベンゼン	一般環境	0.61	0.82	0.59	3
トリクロロエチレン	一般環境	0.27	0.20	0.25	130
テトラクロロエチレン	一般環境	0.064	0.057	0.065	200
ジクロロメタン	一般環境	1.2	0.98	1.2	150
アクリロニトリル	一般環境	0.018	0.035	0.035	2*
アセトアルデヒド	一般環境	2.4	2.4	1.9	120*
塩化ビニルモノマー	一般環境	0.053	0.077	0.071	10*
塩化メチル	一般環境	1.8	1.3	1.4	94*
クロロホルム	一般環境	0.20	0.16	0.18	18*
1,2-ジクロロエタン	一般環境	0.14	0.14	0.13	1.6*
水銀及びその化合物	一般環境	0.0018	0.0020	0.0016	0.04*
ニッケル化合物	一般環境	0.0025	0.0019	0.0018	0.025*
ヒ素及びその化合物	一般環境	0.00076	0.00056	0.00092	0.006*
1,3-ブタジエン	一般環境	0.11	0.055	0.052	2.5*
マンガン及びその化合物	一般環境	0.020	0.014	0.012	0.14*
クロム及び三価クロム化合物	一般環境	0.0034	0.0031	0.0029	—
六価クロム化合物	一般環境	0.00021	0.00018	0.00022	—
酸化エチレン	一般環境	0.064	0.077	0.067	—
トルエン	一般環境	3.3	2.5	3.8	—
ベリリウム及びその化合物	一般環境	0.000018	0.000015	0.000014	—
ベンゾ(a)ピレン	一般環境	0.000096	0.00017	0.00018	—
ホルムアルデヒド	一般環境	2.6	2.7	2.6	—

注) (1) 平均値を算出する際、検出下限値未満の測定値は検出下限値の1/2として算出した。

(2) 環境基準値又は指針値欄の*印のついた値は、指針値を表す。

追浜行政センター

単位：μg/m³

測定項目	測定地点 属性	令和7年度 年平均値	令和6年度 年平均値	令和6年度 属性別全国平均値	環境基準値 又は指針値
ベンゼン	固定発生源周辺	0.55	0.77	0.91	3
トリクロロエチレン	一般環境	0.28	0.22	0.25	130
テトラクロロエチレン	一般環境	0.060	0.058	0.065	200
ジクロロメタン	固定発生源周辺	1.3	1.1	1.9	150
アクリロニトリル	一般環境	0.016	0.029	0.035	2*
アセトアルデヒド	一般環境	2.6	2.5	1.9	120*
塩化ビニルモノマー	一般環境	0.026	0.081	0.071	10*
塩化メチル	固定発生源周辺	1.3	1.3	2.1	94*
クロロホルム	一般環境	0.21	0.17	0.18	18*
1,2-ジクロロエタン	一般環境	0.14	0.14	0.13	1.6*
水銀及びその化合物	一般環境	0.0020	0.0021	0.0016	0.04*
ニッケル化合物	固定発生源周辺	0.0018	0.0016	0.0041	0.025*
ヒ素及びその化合物	一般環境	0.00072	0.00053	0.00092	0.006*
1,3-ブタジエン	一般環境	0.050	0.040	0.052	2.5*
マンガン及びその化合物	固定発生源周辺	0.015	0.013	0.042	0.14*
クロム及び三価クロム化合物	一般環境	0.0027	0.0027	0.0029	—
六価クロム化合物	一般環境	0.00017	0.00020	0.00022	—
酸化エチレン	固定発生源周辺	0.067	0.080	0.18	—
トルエン	固定発生源周辺	5.5	9.2	5.3	—
ベリリウム及びその化合物	一般環境	0.000020	0.000013	0.000014	—
ベンゾ(a)ピレン	一般環境	0.000069	0.00012	0.00018	—
ホルムアルデヒド	固定発生源周辺	2.6	3.0	2.7	—

注) (1) 平均値を算出する際、検出下限値未満の測定値は検出下限値の1/2として算出した。

(2) 環境基準値又は指針値欄の*印のついた値は、指針値を表す。

(参考1) 大気汚染物質について

1 二酸化窒素 (NO₂)

赤褐色の気体で、大気中の窒素酸化物 (NO_x) の主要成分である。

空気中で燃料などの物の燃焼、合成、分解等の処理を行うとその過程で窒素酸化物が生成し、燃焼温度が高温になるほど多量に生成する。発生源では、窒素酸化物は90%以上が一酸化窒素 (NO) であり、大気中で酸化されて、二酸化窒素 (NO₂) となる。

主な発生源は、工場・事業場、自動車などである。

2 浮遊粒子状物質 (SPM)

大気中に浮遊する粒子状物質のうち、粒径が10μm (=0.01mm : 100分の1mm) 以下の微細な粒子の総称である。

主な発生源は、工場・事業場のばいじん (物の燃焼に伴い発生) ・粉じん (物の破砕に伴い発生)、ディーゼル自動車の黒煙のほか、これらが大気中で反応した二次生成物質や土壌粒子、海塩粒子など多岐にわたっている。

3 光化学オキシダント (O_x)

オゾン (O₃)、パーオキシアセチルナイトレート (PAN) などの酸化性物質の総称であり、大気中の窒素酸化物 (NO_x) と炭化水素 (炭素と水素からなる物質の総称) から、太陽光線に含まれる紫外線による光化学反応で生成する。

光化学スモッグとは、日差しが強い、気温が高い、風が弱いなどの特殊な気象条件下で光化学オキシダントが滞留し、白くモヤがかかったような状態のことをいう。

4 二酸化硫黄 (SO₂)

無色、刺激臭のある気体であり、主に、化石燃料に含まれる硫黄分 (S分) の燃焼、酸化により生成するほか、火山活動などの天然現象によるものがある。主な発生源は、工場・事業場、軽油を燃料としたディーゼル自動車などである。

5 一酸化炭素 (CO)

無色、無臭の気体で、主として物の不完全燃焼により生成する。都市では、その60~70%が自動車排出ガスに起因するといわれている。

6 微小粒子状物質 (PM_{2.5})

大気中に浮遊する粒子状物質のうち、粒径が2.5μm (μm : 1,000分の1mm) 以下の粒子の総称である。主な発生源としては、ボイラー、焼却炉などのばい煙を発生する施設、コークス炉、鉱物の堆積場等の粉じんを発生する施設、自動車、船舶、航空機等、人為起源のもの、さらには、土壌、海洋、火山等の自然起源のものがある。

(参考2) 有害大気汚染物質について

物 質 名	用 途* ¹	毒 性* ²
ベンゼン	有機合成原料、絶縁油、染料・合成ゴム・スチレンモノマー等原料、溶剤	麻酔作用、造血機能障害、発ガン性
トリクロロエチレン	金属脱脂洗浄、各種溶剤、殺虫剤、羊毛脱脂洗浄	麻酔作用、神経障害
テトラクロロエチレン	脱脂洗浄剤、ドライクリーニング溶剤、香料、各種溶剤	めまい、頭痛、肝機能障害
ジクロロメタン	塗料離剤、金属脱脂洗浄剤、冷媒、抽出溶剤	麻酔作用、めまい、吐き気
アクリロニトリル	アクリル系合成繊維、合成ゴム、合成樹脂原料、塗料	めまい、嘔吐、中枢神経系麻痺、腹痛、下痢、皮膚炎
アセトアルデヒド	有機合成原料、防腐剤、写真現像溶剤、燃料配合剤	結膜炎、気管支炎、肺浮腫、麻酔作用
塩化ビニルモノマー	ポリ塩化ビニル原料	麻酔作用、発ガン性
塩化メチル	シリコーン樹脂の原料、界面活性剤、発泡剤	神経細胞への影響
クロロホルム	フッ素系冷媒・樹脂原料、溶剤、有機合成原料、血液防腐剤、麻酔剤等	麻酔作用、肝機能障害、消化器障害
1,2-ジクロロエタン	塩化ビニルモノマー原料	肝・腎・副腎障害、中枢神経抑制作用、消化器障害
水銀及びその化合物	蛍光灯、体温計、触媒、医薬品、分析試薬	腎障害、中枢神経障害、催奇形性
ニッケル化合物	電気メッキ、電鍍、触媒、着色剤	金属熱、気管支炎、皮膚炎、発ガン性
ヒ素及びその化合物	高純度半導体、防腐剤、農薬、染料原料、触媒	体重減少、悪心、皮膚の色素沈着、肝障害、発ガン性
1,3-ブタジエン	合成ゴム原料、ABS樹脂原料、ナイロン66原料	頭痛、めまい、耳鳴り、意識障害
マンガン及びその化合物	乾電池、酸化剤、フェライト、マッチ原料、硝子着色剤、アンチノック剤	精神障害、呼吸器障害
六価クロム	研磨剤、顔料、皮なめし剤、写真製版	発ガン性
酸化エチレン	有機合成原料、界面活性剤、顔料、燻蒸消毒、殺菌剤	催奇形性、変異原生、強い全身刺激性あり
トルエン	油性塗料、接着剤	運動障害、記憶障害
ベリリウム及びその化合物	工業用製品原料（X線窓、航空機部品等）	皮膚炎、結膜炎、気管・気管支炎、ベリリウム肺、発ガン性
ベンゾ[a]ピレン	非意図的生成物質	発ガン性、変異原性
ホルムアルデヒド	合成樹脂原料、界面活性剤、農薬、消毒剤、防腐剤、有機合成原料	皮膚炎、気管支炎・喘息様症状

備考

*1 PRTR パイロット事業中間報告-環境汚染物質排出・移動量集計結果-（環境庁環境保健部環境安全課、平成10年5月）等を参考にした。

*2 環境科学辞典（第1版、1985年、(株)東京化学同人）及びPRTR パイロット事業中間報告-環境汚染物質排出・移動量集計結果-（環境庁環境保健部環境安全課、平成10年5月）等を参考にした。